



หากถูกกัดแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?



1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด
ฟอกสบู่เบาๆ ให้ทั่วกัดแผล
และล้างออกให้หมด
(ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที) การล้างแผล
จะช่วยลดปริมาณเชื้อได้ถึง **80%**



2. กายาบาดาติน
และรับการแพทย์
โดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษ
และฉีดวัคซีนป้องกันโรค



3. กักสุนัขเพื่อดูอาการ **10 วัน**
ถ้าตายให้นำซากมาตรวจ เผาได้ไม่ตาย
แสดงว่าสุนัขตัวนั้นไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4. ฉีดวัคซีนต่อให้ครบตามนัด
และควรเข้ารับวัคซีน
ให้ครบตามที่แพทย์นัด



ป้องกันสุนัขกัด ได้อย่างไร ?



หลักคณา **5 ย.** ได้แก่

“อย่าเหย อย่าเหยียบ อย่าแยก
อย่าหยิบ อย่ายุ่ง”



1. **อย่าเหย**
ให้สุนัขโมโห

อย่าเหยียบสุนัข
หรือทำให้ตกใจ



3. **อย่าแยก**สุนัขที่กำลังกัดกัน
ด้วยมือเปล่า

อย่าหยิบซานอาหาร
หรือของที่สุนัขหวง



5. **อย่ายุ่ง**กับสุนัขจรจัด
หรือสุนัขที่ไม่ทราบประวัติวัคซีน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
โทร 073-416722



โรค พิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร รวมถึงคน เมื่อได้รับเชื้อ หากปล่อยไว้จนเกิดอาการ จะเสียชีวิต ทุกราย แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน



ปัจจุบันยังไม่มียารักษา
โรคพิษสุนัขบ้า



สัตว์ที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้า มีอาการอย่างไร?



สัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า อาจแสดงอาการได้

3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะเริ่มแรก



มีอาการและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม กินข้าว
กินน้ำลดลง

2. ระยะตื่นเต้น

กระวนกระวาย ตื่นเต้น
ไม่อยู่นิ่ง กัดทุกสิ่งไม่เลือก
วิ่งไล่กัดคนหรือสัตว์



3. ระยะอัมพาต

ค้างคอก ลิ่น หอยสีแสด ค้างคาว น้ลายไหล ทรงตัว
ไม่ได้ เป็นอัมพาตและตาย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะติด
จากสัตว์ที่มีอาการเหล่านี้



ติดต่อได้ทางไหนบ้าง ?

สามารถติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าได้ 2 ทาง คือ

1. **ถูกกัดหรือข่วน** ทำให้น้ำลายของสัตว์เข้าสู่
ร่างกายผ่านทางบาดแผล แม้แผลเพียงเล็กน้อย
ก็สามารถติดต่อได้



2. **ถูกเลียที่บาดแผล** รอยถลอกหรือรอยขีดข่วน
รวมทั้งริมฝีปากหรือนัยน์ตา



อาการโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอย่างไร ?

(ผู้ป่วยจะแสดงอาการ หลังได้รับเชื้อประมาณ
3 สัปดาห์ - 6 เดือน หรืออาจนานถึง 1 ปี)

- **อาการเริ่มแรก:** ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร
อ่อนเพลีย และคันรุนแรงบริเวณแผลที่ถูกกัด
- **อาการทางประสาท:** กระสับกระส่าย คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย
กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการหนาวสั่น
กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว
- **อาการระยะสุดท้าย:** กล้ามเนื้อเกร็ง - กระตุก แขนขาอ่อนแรง
หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก หมดสติและ
เสียชีวิตในที่สุด

