

คาถา 5 ย กันสุนัขกัด

ย1

อย่าแหย่ สุนัขให้โมโห

ย2

อย่าเหยียบหาง หิว

ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัข
ตกใจ

ย3

อย่าแหย่สุนัขที่กำลังกัด
กันด้วยมือเปล่า

ย4

อย่าหยิบจานข้าวที่สุนัข
กำลังกินอยู่

ย5

อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัข
ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน
ต้องทำดังนี้

1 ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำ
และสบู่หลายๆ ครั้ง
เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยา
รักษาแผลสด

2 จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อ
สืบหาเจ้าของ

กักหมา - แมว สอบถาม
ประวัติการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3 ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อรับการ
ป้องกันที่ถูกต้อง





สุนัขกัด ต้องล้างแผล

ใส่ยา กักหมา

หาหมอ ฉีดวัคซีนป้องกัน
ครบชุด



โรคพิษสุนัขบ้า
สุนัขกัด ต้องล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หาหมอ
ฉีดวัคซีนให้ครบชุด



โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่
คนที่อันตรายที่สุด
เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีรูปร่าง
คล้ายลูกกระสุนปืน เชื้อนี้
ถูกทำลายได้ง่ายเมื่อถูก
ความร้อน แสงแดด
น้ำยาฆ่าเชื้อพวกคลอรีน
แอลกอฮอล์ กรดหรือ
ด่างอย่างแรง เกิดได้ใน
สัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้ง
สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น
สุนัข แมว วัว ควาย
ชะนี กระรอก กระแต
หนู ค้างคาว รวมทั้งคน
แต่ในประเทศไทยพบมาก
ที่สุดในสุนัข 96% ของ
จำนวนที่พบเชื่อจากการ
วินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ)
รองลงมาคือแมว



การติดต่อ

โดยการได้รับเชื้อที่อยู่ในสัตว์
จากการถูกกัด ข่วน เลีย หรือ
น้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก
หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล



ระยะฟักตัวในสุนัข

7 วัน ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับ
บริเวณที่ได้รับเชื้อและความรุนแรง
ของเชื้อโรค โดยเฉลี่ยใช้เวลา
ประมาณ 2 ถึง 6 สัปดาห์

อาการในสุนัข

1. ชนิดซึม สุนัขจะมีนิสัยแปลกไปจากเดิม
ชอบซุกตามมุมมืด กินอาหารและน้ำน้อยลง
ถ้าถูกรบกวนจะดุร้าย กัดไปทั่ว ต่อมาจะเป็น
อัมพาต และตายในที่สุด
2. ชนิดดุร้าย จะมีอาการทางประสาท
กระวนกระวาย หงุดหงิด ดุร้าย ขากรรไกร
แข็ง ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ม่านตา
ขยาย วิ่งโดยไม่มีจุดหมาย ต่อมาจะมีอาการ
อัมพาต เริ่มจากกล้ามเนื้อคอ ทำให้กลืน
น้ำลายหรือน้ำลำบาก (บางครั้งจึงเรียกโรคนี้
ว่าโรคกลืนน้ำ) ระบบหายใจล้มเหลวและตายใน
ที่สุด รวมระยะเวลาดังแต่เริ่มแสดงอาการ
จนถึงตาย ประมาณไม่เกิน 10 วัน

ทำอย่างไรเมื่อถูกสุนัขกัด

1. ล้างแผล เมื่อสัตว์กัดหรือข่วนจนเป็น
แผล ต้องล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่หลายๆ
ครั้ง เพื่อให้เชื้อออกจากบาดแผลให้มาก
ที่สุด
2. ใส่ยา ใส่ยาใส่แผล เช่น ทิงเจอร์เบตา
ดิน หรือแอลกอฮอล์ จะช่วยฆ่าเชื้อโรค
และอย่าใส่สิ่งอื่น เช่น เกสโซ ยาฉุน ลง
ในแผลเป็นอันตราย
3. กักหมา กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่าง
น้อย 15 วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้าย กัดคน
หรือสัตว์อื่น ถ้าไม่สามารถกักสัตว์นั้นไว้ได้
ให้ทำลาย หรือถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่า
สัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
4. หาหมอ พบแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันที
เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
และซีรัม อย่ารอจนสัตว์ที่กัดตาย เมื่อ
สัตว์ตายให้รีบตัดหัวสัตว์ส่งตรวจหาเชื้อ
โรคพิษสุนัขบ้าทันที

